

Vacinação em cães

Cuidar da saúde do seu cãozinho de estimação é cuidar da saúde de sua família!



Os bichinhos de estimação, entre eles os cães, vem ganhando cada vez mais espaço nas famílias brasileiras, sendo cada vez mais acolhidos, mimados e desejados por seus tutores.

Porém, é importante visar pela saúde e bem-estar tanto dos nossos cães, como também de nossa família, e para isso a vacinação é fundamental!



POR QUE A VACINAÇÃO É IMPORTANTE?

A vacinação protege nossos cães contra doenças infecciosas e contra os agentes circulantes dessas doenças, impedindo que haja a disseminação entre eles. Além de proteger e possibilitar que eles cresçam saudáveis, as vacinas também protegem os seres humanos contra as zoonoses.

MAS... O QUE SÃO ZONNOSES?

São doenças transmitidas dos animais aos seres humanos e que representam uma grande ameaça à saúde de toda população.



QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS VACINAS QUE NOSSOS CÃES DEVEM TOMAR?



Todas as vacinas são de grande importância porém, existem algumas que devem receber uma atenção especial, como: polivalente, antirrábica, gripe canina, contra leishmaniose e giárda.



QUAIS DOENÇAS SÃO PREVENIDAS COM A VACINA POLIVALENTE?

Esta vacina é assim chamada pois protege nossos amigões contra as principais doenças de cães por isso, é considerada uma das mais importantes!



As vacinas mais seguras são importadas e vendidas como: V8 ou V10 que protegem contra cinomose, parvovirose, adenovirose, coronavirose, parainfluenza, hepatite infecciosa e leptospirose (2 ou 4 tipos de cepas diferentes)



PRA QUE SERVE A VACINA ANTIRRÁBICA?

A vacina antirrábica tem como principal função prevenir a raiva - que é uma zoonose - transmitida por um vírus.


Ela é contraída através de mordidas, arranhaduras, lambeduras ou contato indireto com saliva e sangue de animais contaminados. O principal transmissor da doença é o morcego, porém, gatos, cães e outros animais silvestres também podem propagá-la.

Ela compromete o sistema nervoso, tanto nos humanos quanto nos animais.

Os principais sintomas nos animais são: excitação, agressividade, medo e demência.

Nos humanos causa febre, espasmos musculares e confusão mental.





O QUE É A LEISHMANIOSE?

A leishmaniose é uma infecção parasitária transmitida através do mosquito palha, que quando infectado com o protozoário causador da doença, chamado Leishmania, transmite o parasito a seres humanos e animais saudáveis.

A Leishmania ataca o sistema imunológico e pode causar diversas alterações em órgãos abdominais, mucosas e pele - como feridas difíceis de cicatrizar.






E A GIARDÍASE?

A giardíase é uma doença infecciosa que acomete o sistema gastrointestinal, tanto em animais quanto em seres humanos. Pode ser contraída diretamente entre um animal saudável e outro infectado ou indiretamente, quando há o contato com alimentos, água ou lugares contaminados.

Nos animais os principais sintomas são: diarreia, fezes esverdeadas, vômito e perda de peso. Enquanto nos seres humanos causa cólicas abdominais, gases, eructações e diarreia aquosa.





CACHORRO PEGA GRIPE?

Sim, ela é causada pelo vírus Influenza A que ataca o organismo dos cães provocando sintomas similares aos apresentados pelos humanos quando gripados, ou seja, tosse, coriza, fraqueza e febre.

Ela é transmitida no contato direto com animais comtaminados, em parques, áreas de passeio ou ambientes fechados. A vacinação é a melhor forma de impedir que seu animal fique doente e se torne susceptível a doenças respiratórias.



CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

Agora que você conhece a importância das vacinas, é preciso atentar-se ao calendário do seu cãozinho, evitando atrasos nos dias de levá-lo ao veterinário para vacinar!



| Doença | Vacinação Inicial | Doses e Intervalos | Reforço |
|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| Polivalente (V8 ou V10) | A partir de 6 semanas | Varia entre 3 ou 4 doses. Com intervalos de 3 semanas entre as aplicações. | Uma dose, anualmente. |
| Gripe canina | A partir de 8 semanas | Duas doses quando realizadas de forma injetável, com 3 semanas de intervalo entre elas. E dose única quando aplicadas de forma intranasal. | Uma dose, anualmente. |
| Giárdia | A partir de 8 semanas | Duas doses com intervalos de 3 semanas entre as aplicações. | Uma dose, anualmente. |
| Leishmaniose | A partir de 4 meses | Três doses com intervalo de 21 dias entre as aplicações. | Uma dose, anualmente. |
| Antirrábica | A partir de 12 semanas | Uma dose. Pode ser indicado um reforço em áreas com altos índices de exposição à doença. | Uma dose, anualmente. |



Cachorro feliz é cachorro
vacinado e protegido!



Coordenador: Prof. M.V. M.Sc. Ricardo Birolini Clasta

Professora responsável: M.V. M.Sc. Marilia Mascarenhas Souza

Realização: Curso de graduação em Medicina Veterinária

(1º período)

Acadêmicos:

Bárbara Zanuzo

João Pedro Trevisol

Jordano Bernardi

Julia Duarte

Kamily Cristina Ketlin Jaeger

Maicon Vinicius

Mikaely Azevedo

Samira Werner

Sthefany Scheffer Cunha

