

VOCÊ CONHECE A
LEISHMANIOSE?



Antes de entender sobre a Leishmaniose, vou te explicar o que é uma ZOONOSE...



Zoonoses são doenças que podem ser transmitidas de homem para animal ou de animal para homem. Podendo ser causada por vírus, fungos, parasitas e bactérias. Podem ser transmitidos através de contato direto com secreções (saliva, sangue, urina, fezes) e indireto (mordidas, arranhões, superfícies contaminadas), por vetores e alimentos.



E ENTÃO O QUE SERIA LEISHMANIOSE...



- ➔ **Leishmaniose é uma zoonose causada por um protozoário.**
- ➔ **É comum em regiões de clima quente e úmido.**
- ➔ **Transmitida através da picada do mosquito palha.**

2. O mosquito infectado ao picar um cachorro contamina-o e assim o protozoário se desenvolve no animal e o cão se torna como um reservatório da doença.



1. Mosquito palha transmissor da Leishmaniose. O inseto com o parasita Leishmania transmite a doença.



Leishmaniose

Ciclo infecção



3. O mosquito ao picar o animal infectado se infecta com o parasita e quando picar outros cães e pessoas transmitem a doença.



4. Quando o mosquito palha infectado picar um ser humano ele fica contaminado com a doença e começa a apresentar os sintomas e se não tratada em 90% dos casos pode ir a óbito. O ser humano infectado também se torna um reservatório da doença.

SINTOMAS

Nos cães:

Perda de pêlos: patas e ao redor da cabeça , desânimo, sonolência e fraqueza, crescimento exacerbado das unhas, feridas no focinho, patas e nas orelhas, inchaço nas pernas, sangramento no nariz.



DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é feito através da amostra de sangue.

**AQUI EM FOZ DO IGUAÇU É OFERECIDO UM
TESTE GRATUITO NO CCZ!**

**VOCÊ
SABIA?**

TRATAMENTO

O protocolo de tratamento é igual pra todos, entretanto, dependendo da imunidade do animal, eles podem apresentar diferentes sintomas. E o tratamento pode variar de acordo com os sinais clínicos.

FORMAS DE PREVENÇÃO

Coleira Antiparasitária

Duração de 4 a 6 meses



Repelente Spray
250ML

Aplicação semanal



AMBOS TEM DIVERSAS VARIAÇÕES DE PREÇOS.

VACINA

A vacina contra Leishmaniose Visceral Canina que está disponível no mercado, pode ser aplicada em cães a partir de 4 meses de idade, saudáveis e que tenham o teste de Leishmaniose negativo.

O protocolo completo deve ser feito com 3 doses, e um intervalo de 21 dias entre cada aplicação. A vacinação anual é repetida na mesma data da primeira dose que seu amigão recebeu quando era um filhotinho.





TODOS JUNTOS CONTRA A LEISH!



**Vacinem e
protejam seus
doguinhos e sua
família!**



**A leishmaniose é
coisa séria e
pode ser
fatal.**





CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS

PROJETO DE EXTENSÃO: VET EDUCA - 2021

COORDENADOR: PROF. M.V. M.SC. RICARDO BIROLINI CLASTA

PROFESSORA RESPONSÁVEL: M.V. M.SC. MARILIA MASCARENHAS SOUZA



REALIZAÇÃO: CURSO DE GRADUAÇÃO EM
MEDICINA VETERINÁRIA (1º PERÍODO)



Acadêmicos:

Amannda Piccinini

Anna Benitez

Daniel Goy

Danieli Kolberg

Eduardo Zeni

Emily Gabriela

Gabriel Turcato

Gabrielly La Falce

Myllena Bremm

